

Hämophilie-Notfallbogen

Name des Kindes:

Alter des Kindes:

Mutter (Name, Handynummer):

Vater (Name, Handynummer):

Hämophilie A

Hämophilie B

von-Willebrand-Syndrom

Behandlungszentrum und Ansprechpartner:

Notrufnummer Behandlungszentrum:

Für Notarzt/Behandlungszentrum

Präparat und Hersteller:

Dosierung:

Das Faktorpräparat ist kühl gelagert in/im:

Weitere chronische Erkrankungen:

Weitere Medikamente:

Handlungsempfehlungen
nach Verletzung des Kindes:

- Ruhe bewahren, beruhigend auf das Kind einwirken
- Kind von anderen Kindern/Personen trennen
- Kind nicht alleine lassen

Symptome

Was ist zu tun?

Blauer Fleck

Kühlen mit Kühlkissen

Nasenbluten

Kopf nach vorne beugen, Nasenflügel 15 Min. zusammendrücken, kalte Kompresse auf Stirn oder Nacken, etwaiges Blut ausspucken

Äußere Blutung (Schürf-,
Platz- und Schnittwunden)

Desinfektion; mit steriler Kompresse Druck auf die Wunde ausüben

Blut im Urin

Ruhe und viel trinken

Gelenk- und Muskelblutungen

Körperteil hochlagern und kühlen; leichtes bandagieren möglich

Erbrechen und Schwindel nach Sturz

Sofort den Notarzt verständigen



Verletzungen im Kopf- und Bauchbereich können zu größeren äußeren Blutungen führen, aber gleichzeitig können auch innere Blutungen auftreten. Daher sollte sofort der Notarzt unter 112 angefordert werden.

