



Impfkalender

für Kinder und Jugendliche und Erwachsene

Wir fürs Impfen

Impfung	Alter in Jahren				
	5 – 6	9 – 14	15 – 17	ab 18	ab 60
Tetanus	A1	A2		A (ggf. N) ^b	
Diphtherie	A1	A2		A (ggf. N) ^b	
Pertussis	A1	A2		A (ggf. N) ^b	
Poliomyelitis	N	A1		ggf. N	
Hepatitis B	N				
Pneumokokken	Indikationsimpfung für Risikopatienten				S ^d
Meningokokken C	N		Indikationsimpfung für Risikopatienten		
Masern	N		S ^c		
Mumps, Röteln	N				
Varizellen	N				
Influenza	Indikationsimpfung für Risikopatienten				S (jährlich)
HPV Humane Papillomviren		G1 ^a	G2 ^a	N ^a	
FSME Frühsommer-Meningoenzephalitis	Indikationsimpfung				

Erläuterungen

G → Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4)

A → Auffrischimpfung

S → Standardimpfung

N → Nachholimpfung
(Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

a → Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff) mit 2 Dosen im Abstand von 6 Monaten, bei Nachholimpfung im Alter > 13 bzw. > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 6 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).

b → Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

c → Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, mit einem MMR-Impfstoff

d → Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff

Quelle: Adaptiert nach Robert Koch-Institut(RKI), Epidemiologisches Bulletin 34/2015